

VRAGEN?



Heb je een vraag over lachgas of andere middelen? Neem dan contact met ons op!

INSTAGRAM: @_1NUL1

FACEBOOK: @1NUL1

TELEFOON: 0113 26 71 43

EMAIL: INFO@1NUL1.NL



www.1nul1.nl

1NUL1 is powered by Emergis preventie

LACHGAS

Lachgas is een kleurloos zoet geurend en smakend gas. De werkzame stof is distikstofmonoxide of ook wel aangeduid als N2O. In de medische wereld wordt lachgas gebruikt als een anestheticum, ofwel een pijnstillend middel. Als drugs is het een dissociatief tripmiddel.

Lachgas wordt geïnhaleerd uit een ballon. Het gas wordt door middel van een slagroomsput (1 of 2 patronen) of een grote metalen cilinder (lachgascracker) of vanuit een lachgastank in de ballon gespoten. Je ademt in en uit in de ballon en houdt hierbij het geïnhaleerde gas enkele seconden in je longen.

WAT DOET 1NUL1



Ons werk bestaat uit het informeren en adviseren van jongeren op het gebied van alcohol, drugs, internetten, gamen en gokken. Dit doen wij op een outreachende manier, wat betekent dat wij te vinden zijn waar de jongeren zijn; op straat, in het uitgaan, op festivals, op school en bij jongerencentra... etc.

ALLES WAT JE MOET WETEN OVER



LACHGAS



www.1nul1.nl



WAT IS DE WERKING

Lachgas zorgt voor een korte roes van 1 tot 5 minuten. De zintuigen nemen prikkels, zoals geluid en zicht anders waar.

EFFECTEN VAN LACHGAS:

- High gevoel
- Duizelig
- Euforisch
- Angstig
- Lacherig
- Onrust
- Tintelingen
- Misselijkheid
- Hoofdpijn
- Verwardheid
- Vervorming van licht en geluid


RISICO'S KORTE TERMIJN



Er ontstaat zuurstoftekort in de hersenen waardoor klachten kunnen ontstaan als: misselijkheid, hoofdpijn, duizelig of zelfs bewusteloosheid.



Longen, mond en/of lippen kunnen bevroren als lachgas direct ingeademd wordt.



Bij verkoudheid zit het hoofd verstopt en kan lachgas de druk verhogen waardoor er gehoorschade opgelopen kan worden.



Lachgastanks worden koud bij gebruik en kunnen hierdoor (blijvend) bevroeringsletsel veroorzaken als het in contact komt met de huid.



Bij zwangerschap kan lachgasgebruik ook voor zuurstoftekort bij de baby zorgen.



Deelname aan verkeer direct na of tijdens gebruik van lachgas is zeer gevaarlijk. Zorg ervoor dat je minstens een uur nuchter bent voor je je weer in het verkeer begeeft. Gebruik dus nooit lachgas tijdens het rijden.

RISICO'S LANGE TERMIJN



Vitamine B12- tekort kan ontstaan door veelvoudig gebruik van lachgas. Er kunnen klachten ontstaan als: tintelingen, duizeligheid, verdoofd gevoel en pijscheuten. Bij veelvuldig gebruik kan zenuwschade ontstaan.

VERSLAVING

Lachgas kan geestelijk verslavend zijn. Sommige gebruikers verlangen na een ballon direct een volgende ballon. Daarnaast kan er milde tolerantie optreden na gebruik van lachgas; je hebt dan steeds meer nodig om effect te voelen.

